CANCER DEL CUELLO UTERINO

HUGO QUIROZ (*)

Hospital "St. Joseph Mercy", Ann Arbor, Mich., EE. UU.

El propósito de este trabajo es el de poner en evidencia los cambios conceptuales que se han producido en el conocimiento del cáncer cervical uterino, las consecuencias clínico-terapéuticas y las posibilidades actuales para el diagnóstico precoz, tratamiento efectivo y profilaxis. En base a un estudio comparativo de las estadísticas latino-americanas y norteamericanas, se harán, además, deducciones y recomendaciones apropiadas.

Las lesiones histopatológicas que se citan en este trabajo han sido descritas y reconocidas desde hace mucho tiempo, con una diversidad de apelativos. Las relaciones patogenéticas, la historia natural del cáncer cervical, las aplicaciones clínicas, terapéuticas y profilácticas son, en gran parte, el resultado de los estudios citopatológicos estimulados principalmente por la aplicación, en masa, de la citología exfoliativa cervico-vaginal. Lo que en años anteriores eran problemas puramente académicos, se ha proyectado ahora en aplica-

ciones clínicas inmediatas. Gracias a los numerosos estudios comparativos de citología y biopsia, se han podido seguir de cerca las transformaciones neoplásticas del epitelio cervical uterino.

Estas afirmaciones no excluyen las contribuciones de Schiller, Hinselmann y la escuela alemana, cuyos brillantes estudios colposcópicos no pueden ser usados fácilmente por la necesidad de dominar una técnica difícil. En manos expertas, que las son pocas, las técnicas colposcópicas aplicadas al caso individual son tan buenas y tal vez mejores que las que se obtienen partiendo de las encuestas citológicas (1, 2).

Los cambios atípicos del epitelio cervical varían desde aquellos escasamente diferentes de los enteramente benignos hasta aquellos muy difíciles de di-

(*) Egresado de la Facultad de Medicina, Universidad Central de Quito. Dirección actual: 1414 Normandy, Ann Arbor, Michigan, EE. UU.

ferenciar del carcinoma intraepitelial o in situ. Las transiciones son obligadamente detenidas para la observación; realmente son lesiones en constante movimiento. Aquí nos estamos refiriendo a las "lesiones limítrofes" de Koss los "epitelios inquietos" de Wespi, Glatthaar y Held, de Suiza, y a lo que se designa con el término ya aceptado internacionalmente, la displasia.

Estudios prospectivos, retrospectivos y experimentales permiten deducir que la displasia precede al carcinoma in situ y éste, a su vez, precede al carcinoma invasivo. Conviene aclarar que la displasia es un proceso que puede desaparecer o ser eliminado con biopsias de excisión. Reagan³ relata que de 223 mujeres estudiadas durante un período promedio de 3,8 años, sin tratamiento definitivo, sólo el 5,8% demostraron cáncer in situ, en última instancia.

El carcinoma in situ debe ser considerado como la fase inicial del cáncer escamoso y evidentemente precede al carcinoma invasivo. Repitiendo las palabras de Steward¹⁷: "Cada carcinoma invasivo tiene que originarse en un carcinoma in situ, ya que no hay otra cosa de la que pueda originarse a pesar de las dudas que se han expresado sobre esta relación".

ALTERACIONES BENIGNAS Y MALIGNAS

En la Tabla I se hace un sumario de las características diferenciales entre la metaplasia escamosa, proceso puramente benigno, la displasia y el carcinoma in situ del cuello uterino.

En nuestros laboratorios, antes de 1960, no se hacían diagnósticos de displasia o lesiones dudosas que caen ahora dentro de este rubro. Los diagnósticos eran positivos o negativos; la mujer tenía o no tenía cáncer. Las dudas y divergencias de los patólogos por lo general no trascendían en el reporte escrito. En consecuencia, el médico tratante podía aplicar las reglas establecidas para el tratamiento, con las variaciones determinadas por la extensión clínica e histopatológica del cáncer. Los estudios citopatológicos de los últimos años, han producido una serie de cambios. En los Estados Unidos, las estadísticas de todos los hospitales muestran una disminución rápida de los casos de cáncer cervical invasivo, en tal forma que ahora la mayoría de los casos son de carcinoma in situ o con invasión incipiente, grados I y IA de la clasificación internacional, respectivamente.

Los cambios observados en el Detroit Receiving Hospital son relatados por Stevenson y colaboradores⁽⁵⁾. De un cuadro que incluye todos los años desde 1949 hasta 1960, clasificados por estado clínico han sido tomados los datos al comienzo y al final de la tabla.

Los resultados de la campaña para el diagnóstico precoz con encuesta citológica en el condado de Shelby, Tennessee, son presentados por Ruch y colaboradores⁽⁶⁾. Como consecuencia de la encuesta citológica y el tratamiento de los cánceres in situ así descubiertos, la incidencia del cáncer cervical invasivo bajó del 39/100.000 en 1949 a 19/100.000 en 1961, una diferencia del

Tabla I

METAPLASIA ESCAMOSA	DISPLASIA	CARCINOMA IN SITU
Epitelio columnar del endocérnix reemplazado por células escamosas.	Células escamosas con atipia nuclear moderada.	Células escamosas atípicas o indiferenciadas.
Polaridad del tejido es normal.	Polaridad mantenida o levemente alterada.	Polaridad alterada.
Proporción núcleo / citoplasma inalterada.	Proporción núcleo/citoplasma alterada ligeramente.	Proporción núcleo / citoplasma muy alterada.
Núcleos normales.	Moderada atipia nuclear.	Atipia nuclear generalizada.
Mitosis ausentes.	Mitosis escasas.	Mitosis numerosas.
Descamación celular normal.	Descamación celular escasa o moderada.	Descamación celular abundante.
Citología para células malignas es negativa.	Citología para células maligna es dudosa.	Citología para células malignas es positiva.
1 y 1a	2 y 2a	3 y 3a

- FIG. 1.—Metaplasia escamosa cervical. La mayor parte de las células, comenzando por la base, son escamosas. En la capa superficial se ven células con secreción mucosa.
- FIG. 1 a.—Citología: Las células más pequeñas y de núcleos oscuros se originan en áreas de metaplasia endocervical. Estas células son francamente benignas.
- FIG. 2.—Displasia cervical con células escamosas que tienen atipia nuclear moderada. Se nota mayor diferenciación escamosa en las capas superficiales.
- FIG. 2 a.—Citología: Células escamosas con núcleos grandes, moderadamente atípicos e hipercromáticos. Estas células son sospechosas de malignidad.
- FIG. 3.—Carcinoma cervical in situ. Atipia nuclear marcada y generalizada. Polaridad muy alterada. Los cambios afectan todo el grosor del epitelio.
- FIG. 3. a.—Citología: Células descamadas son francamente malignas.

Tabla II

PROPORCION DE CASOS DE CANCER CERVICAL EN EL DETROIT
RECEIVING HOSPITAL, POR AÑOS Y POR ESTADO CLINICO

Año	Clase 0	Clase I y II	Clase III y IV	% de cáncer invasor
1949-1950	0	24 (56%)	19 (44%)	100
1959-1960	100	65 (75%)	22 (25%)	48

51%. La proporción de cánceres avanzados también bajó. Mientras en 1952 sólo 34 de los cánceres eran de grado I, estos tumores in situ fueron el 57% en 1957 y el 67% en 1961.

Sin entrar a discutir y citar muchas publicaciones que corroboran los mismos aspectos, es claro que la citología cérvico-vaginal es una de las armas más eficaces y prácticas en la lucha contra el cáncer cervical. Los países latinoamericanos, con una de las incidencias más altas del mundo, no pueden demorar por más tiempo la necesidad de emprender las encuestas citológicas en masa. Salvo los lugares realmente remotos, la citología cérvico-vaginal puede ser obtenida por cualquier médico, enfermera o ayudante de sala. Por razones obvias, las preparaciones tendrían que ser enviadas a centros citológicos en las grandes ciudades, para el examen microscópico. Dadas las peculiaridades de Latinoamérica, vale la pena considerar la posibilidad de usar el método de Davis, la jeringa de irrigación vaginal (7). Este método permite que la mujer tome la muestra por sí misma y la remita por correo al laboratorio citológico.

FRECUENCIA DEL CANCER
DEL CUELLO UTERINO

A fin de determinar las características y extensión del problema, conviene revisar y citar algunas de las cifras estadísticas latinoamericanas y norteamericanas.

En los Estados Unidos, el cáncer cervical tiene una incidencia del 34/100.000 (8). Datos de Bolivia y El Salvador son impresionantes, porque representan las cifras más altas de Sudamérica. En Bolivia la incidencia es de 74/100.000 (9) y en El Salvador es de 56,39/100.000 (10). En los Estados Unidos el cáncer cervical uterino representa el 11% de los tumores malignos de la mujer (Anderson, obra citada). Los porcentajes en material quirúrgico femenino obtenidos por Correa (11), tienen estos valores para Colombia: Cali, 37,17%; Manizales, 37,65%; y Medellín, 32,4%. En Argentina la cifra es de 27,44%. En El Salvador se cita la cifra más alta, 58,4%.

Con respecto a la incidencia por edad, son presentados datos reportados en el Symposium sobre epidemiología del cáncer del cuello del útero celebra-

do en México del 3 al 7 de Febrero de 1964 (¹²). La tabla III y la figura 1 fueron elaboradas acumulando los datos de Venezuela (Grossmann Siegert), Argentina (Canoninco) y Chile (Moroder, Yépez de Constante, Sandoval). Como se puede observar en estas cifras, que deben ser leídas como cifras de cáncer *invasivo*, las edades de mayor riesgo son de 30 a 60 años. Los datos sobre incidencia de carcinoma in situ son insuficientes. No hay datos de incidencia de displasia.

Tabla III

FRECUENCIA DEL CANCER CERVICO-UTERINO, POR EDADES

Por ciento de casos, según estadísticas de Venezuela, Argentina y Chile

Años de edad	%
21 - 30	5
31 - 40	23
41 - 50	33,1
51 - 60	22,7
61 - 70	11,6
71 y más	4,1

FIG. 1.—INCIDENCIA DEL CANCER UTERINO, POR EDADES. Cifras combinadas de Venezuela, Argentina y Chile.

En los Estados Unidos, la displasia cervical ocurre a una edad promedio de 36,5 años, el carcinoma in situ a los 39,4 años y el carcinoma invasivo a los 50,6 años (¹³). Resalta que la aparición de la displasia y el carcinoma in situ preceden al carcinoma invasivo por 14,1 y 11,2 años, respectivamente.

Las estadísticas relacionadas al estado clínico del cáncer en el momento de ser descubierto, son muy elocuentes. La Tabla IV muestra las cifras en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Estos datos también son tomados y adaptados de los relatos presentados al simposium ya mencionado.

Tabla IV

FRECUENCIA DEL CANCER CERVICO-UTERINO, POR ESTADO CLINICO, CLASIFICACION INTERNACIONAL — (% de casos)

	Argentina	Chile (*)		Colombia	Ecuador	Perú
Clase 0	2	1	4,2	0,14		
Clase I	24,5	16,8	36,6	4,73	11,6	8,2
Clase II	31,6	29,6	34,2	20,23	30,0	28,2
Clase III	30,6	45,8	23,1	47,92	42,5	54,7
Clase IV	11,3	7,4	1,8	26,00	15,8	7,1

(*) Las dos columnas son cifras de dos grupos socio económicos diferentes.

La relación estadística entre la paridad de la mujer y la incidencia del cáncer cervical es revelada en todas las publicaciones pertinentes. Tal cosa es también observada en los trabajos latinoamericanos presentados al simposium tantas veces aludido. Un estudio muy bien controlado fue hecho por Christopherson y Parker ⁽¹⁴⁾ en los Estados Unidos. Estos autores estudiaron 41.504 mujeres sometidas a una encuesta citológica y ginecológica para el diagnóstico precoz del cáncer uterino. Del análisis de esta serie se desprende que hay relación estadística entre la paridad mayor y la incidencia mayor del cáncer in situ y el cáncer invasivo. El 64% de todas las pacientes con cáncer invasivo comenzaron la actividad sexual en la adolescencia. La alta frecuencia del cáncer cervical en gente de bajo nivel socio-económico parece ser debida en gran parte a que la actividad sexual comienza antes, es más continua y con mayor número de embarazos, en este grupo. Se anota, por otro lado, que haciendo las correcciones estadísticas, la diferencia de incidencia del cáncer cervical de acuerdo a la raza (negra o blanca), es el resultado del nivel socio-económico y no de la raza. Los estudios latinoamericanos tienden a corroborar este hecho. Latinoamérica es terreno abonado para estudios que clarifiquen en qué forma las condiciones socio-económicas bajas, influyen para elevar la incidencia del cáncer del cuello uterino.

Aunque no ha sido posible establecer la edad promedio para el cáncer cervical en Latinoamérica, a partir de

los datos que han sido revisados, es posible hacer deducciones. Se revela que la edad media de incidencia debe ser más baja que en los Estados Unidos, posiblemente diez años menos. Teóricamente se podría predecir que tal cosa también sucede con el cáncer in situ y la displasia. Por consiguiente, la edad de riesgo máximo para el carcinoma in situ en Latinoamérica debe ser al rededor de los treinta años. P. Valenzuela, en México relata una edad promedio de treinta y cuatro años para el carcinoma in situ ⁽¹⁵⁾. Para la displasia, al rededor de los 26 años si es que usamos como referencia las cifras obtenidas por Christopherson y Parker ya citadas anteriormente. De donde se deduce la necesidad de hacer los mayores esfuerzos para la profilaxis y el diagnóstico precoz en las mujeres de 20 a 30 años. En este grupo, las posibilidades de salvar madres de familia en pleno vigor, son mucho mayores. También cabe la posibilidad de que existan unos pocos casos de carcinomas, en su mayoría in situ, en mujeres menores de 20 años. Si tal cosa fue encontrada por Ferguson ⁽¹⁶⁾ en un nivel socio-económico bajo de los Estados Unidos, es posible que la incidencia sea mayor en Latinoamérica. El corroborar o desmentir estas predicciones teóricas está en manos de quienes van a hacer y están haciendo los estudios citopatológicos latinoamericanos.

COMENTARIO FINAL

El cáncer del cuello uterino es una enfermedad curable y en cierto modo

prevenible. En el momento actual, el diagnóstico de cáncer avanzado del cuello uterino debe ser considerado como el resultado de la negligencia de la paciente, del médico o de ambos.

El cáncer cervical uterino en Latinoamérica tiene proporciones epidémicas y es el tumor maligno más frecuente en el sexo femenino. Las estadísticas revelan que la mayoría abrumadora de los casos son de cánceres invasivos e incurables, desde el momento mismo en que son descubiertos.

Hay que recalcar en la necesidad imperativa de planificar encuestas citológicas en tres grupos de mujeres, en orden de prioridad: 1) las mujeres casadas de 30 a 50 años; 2) todas las mujeres de 20 a 60 años y 3) las mujeres casadas o en actividad sexual, menores de 20 años.

La encuesta citológica permitiría descubrir la displasia, cánceres in situ o con invasión temprana, que son casi ciento por ciento curables. En unos pocos años se vería la reducción drástica de los cánceres invasores de terminación inexorablemente fatal.

FINAL COMMENT

Cancer of the uterine cervix is a curable disease and in a certain way preventable. At the present time the diagnosis of invasive carcinoma of the cervix must be considered the result of the negligence of the patient, the physician or both.

Cancer of the cervix uteri in Latin-america has epidemic proportions and

it is the most frequent malignant tumor in women. The statistical figures reveal that the largest number of cases are invasive and incurable at the very time in which they are discovered.

It must be emphasized the immediate need to implement cytological surveys in 3 groups of women, in order priority: 1) married women between 30 and 50 years old; 2) all women between 20 and 60 years old; and 3) women less than 20 years old who are married or in active sexual life.

The cytological surveys will permit the diagnosis of dysplasias, cancers in situ or with early invasion. These lesions are almost one hundred per cent curable. A drastic reduction in the number of incurable cancers will be seen in a few years.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1.—NAVRATIL, E.—Chapter 10. "Dysplasia, Carcinoma in Situ and Micro-Invasive Carcinoma of the Cervix Uteri. L. A. Gray.—Charles C. Thomas, Publisher, Springfield, Illinois. 1964.
- 2.—HILL, E. C.—Preclinical Cervical Carcinoma, Colposcopy, and the "Negative" Smear. Amer. J. Obstet. Gynec. 95:308, 1966.
- 3.—REAGAN, J. W.—Chapter 12. "Dysplasia, Carcinoma in Situ and Micro-Invasive Carcinoma of the Cervix Uteri. L. A. Gray.—Charles C. Thomas, Publisher. Springfield, Illinois. 1964.
- 4.—KOSS, L. G. et al.—Some Histological Aspects of Behavior of Epidermoid Carcinoma in Situ and Related Lesions of the Uterine Cervix. Cancer 16: 1160, 1963.
- 5.—STEVENSON, C. S. et al.—Changing Picture of Cervical Carcinoma.—J.A.M.A. 179:92, 1962.
- 6.—RUCH, R. M. et al.—The Changing Inci-

- dence of Cervical Carcinoma. Amer. J. Obstet. Gynec. 89:927, 1964.
- 7.—DAVIS, H. J.—The Irrigation Smear. A Cytologic Method for Mass Screening by Mail. Amer. J. Obstet. Gynec. 84:1017, 1962.
- 8.—ANDERSON W. A. D.—“Pathology”. Fifth Edition. C. V. Mosby, St. Louis, 1966.
- 9.—MACHICAO, N.—Patología geográfica del cáncer del útero en Centro América. Méd. Argent. 52:579, 1965.
- 10.—DIAZ BAZAN, N.—Patología geográfica del cáncer del útero en entro América. Pren. Méd. Argent. 52:589, 1965.
- 11.—CORREA, P.—Encuesta Latinoamericana. Cáncer en material quirúrgico. Comunicación personal. (Las cifras usadas son un promedio de aquellas relatadas individualmente para 1958-1959-1960).
- 12.—SIMPOSIUM sobre epidemiología del cáncer cervical uterino. Pren. Méd. Arg. Vol. 52. Nº 11, 1965.
- 13.—CHRISTOPHERSON, W. M., PARKER, J. E.—Chapter 13. “Dysplasia, Carcinoma in Situ, and Micro-Invasive Carcinoma of the Cervix Uteri. L. A. Gray, Publisher. Charles. C. Thomas, Springfield, Illinois, 1964.
- 14.—CHRISTOPHERSON, W. M., PARKER, J. E.—Relation of Cervical Cancer to Early Marriage and Childbearing. New Eng. J. Med. 237:235, 1965.
- 15.—VALENZUELA, P.—Pesquisa citológica del cáncer del cuello uterino en la ciudad de México. Presentado al Segundo Congreso Internacional de Citología Exfoliativa. Paris, Mayo de 1965.
- 16.—FERGUSON, J. H.—Positive Cancer Smears in Teenage Girls. J.A.M.A. 178: 365, 1961.
- 17.—STEWARD.—Citado por Koss (4).